

- **Carbunco cutáneo:** aparición de escara necrótica negra (lesión típica) en zonas no protegidas y a veces con dolor en la zona, linfangitis, adenopatía regional y septicemia.
- **Carbunco pulmonar:** hipoxia, disnea, fiebre, hipotensión, shock y muerte. Son frecuentes signos meníngeos (50%).
- **Carbunco gastrointestinal y orofaríngeo:** violenta gastroenteritis con vómitos y deposiciones hemorrágicas y rápido desarrollo de ascitis. El orofaríngeo se caracteriza por tumefacción local, adenopatía, edema y fiebre.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO

- Aislamiento del *Bacillus anthracis* en una muestra clínica.
- Seroconversión.
- Demostración del agente en muestra clínica por inmunofluorescencia directa.
- Detección del genoma de *Bacillus anthracis* en una muestra clínica.

CLASIFICACIÓN DE CASOS

Caso sospechoso/probable: caso compatible clínicamente con cualquiera de las formas clínicas de carbunco y exposición a un animal o producto animal sospechoso.

Caso confirmado: enfermedad clínicamente compatible y que presente al menos uno de los criterios diagnósticos de laboratorio.

CÓLERA

CIE-9 001 CIE-10 A00

Enfermedad de notificación urgente e individualizada con datos epidemiológicos básicos y sujeta al Reglamento Sanitario Internacional.

DEFINICIÓN CLÍNICA DE CASO

Enfermedad caracterizada por diarrea profusa, con heces muy líquidas de aspecto riciforme y deshidratación. La gravedad de los cuadros es muy variable.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO

Aislamiento de *Vibrio cholerae* perteneciente a los serogrupos O1 u O139 toxigénico en heces o vómitos.

CLASIFICACIÓN DE CASOS

Caso sospechoso: compatible con la definición clínica de caso.

Caso probable: compatible con la definición clínica de caso y epidemiológicamente relacionado con un caso confirmado o que procede de un área endémica.

Caso confirmado: compatible con la definición clínica de caso y confirmado por laboratorio.

CRIPTOSPORIDIOSIS

CIE-9: 007.4 CIE-10: A07.2

(Enteritis por *Cryptosporidium*, Criptosporidiasis)

Enfermedad de notificación individualizada con datos epidemiológicos básicos.

DEFINICIÓN CLÍNICA DE CASO

Enfermedad caracterizada por diarrea acuosa, náuseas, vómitos, fiebre, dolores abdominales y deshidratación con duración media entre 1 y 2 semanas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO

- Identificación de ooquistes en heces o parásitos en las fases de su ciclo vital en biopsia de intestino o líquido intestinal.